



hermes



**A profi kert!
A profi partner!
A profi gazdaság!**

Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!

2018. évi 5. felhívás

„Virágzik a kajszzi, nemsokára követi a meggy is.” – kezdtem tavaly március 26-án a 3. felhívást. Az őszibarackoknál a tafrina miatt (4. felhívás), ahol **kajszzi és meggy is található ott a virágfertőző monília** miatt az idén is fel kell venni a permetezőgépet. Átnéztem és frissítettem a 2017-es levelem.

► Már virágzik a kajszzi, nemsokára követi a meggy is. A virágfertőző monília (*Monilinia laxa*) biológiájában tavaly óta nem történt változás. A tüneteit – sajnos - mindannyian jól ismerjük, fotókat sem mellékelek.

A gomba a bibéken keresztül hatol be a növénybe, és a vesszőkben terjedve ágszáradást, fapusztulást okozhat. Most tehát a bibéket kell megóvni a gomba támadásától. Elsőként a virágzó **kajszira** figyeljünk.

Ugyanígy fertőzi a **meggyet** is, sőt már a megpattant rügyön keresztül illetve a zöld csészelevelein át is bejuthat a bimbóba. A folyamatosan nyíló meggyenél már bimbós állapotban védekeznek felszívódó gombaölökkel, majd a virágzás hosszától és az időjárástól függően ismételnék. A tankönyvek szerint, nedves időben, elhúzódó virágzaskor: fehérbimbós állapotban, teljes virágzaskor, 80%-os szíromhullásban majd terméskötődés után is védekezni kell. A nagy ültetvények 3-4 kezeléssel számolnak évről-évre.

Amennyiben ilyen meleg és száraz maradna a tavaszunk, akkor gyorsan elvirágozna a meggy, rövidebb ideig fertőzhetné a gomba. Meleget, ámde sajnos esőket jósolnak a jövő hétre. Jelenleg már az átázott talaj kipárolgása is elegendő nedvességet biztosít a gombának. **Tehát aki nem akar kockáztatni, az máris permetezzen a kajsziban, majd a meggybimbók kibomlását figyelve a meggyben.**

Alább a 2018-ban engedélyezett III. kategóriás készítményeket összesítettem:

Cseresznyében, meggyben: a Teldor 500 SC, a Switch 62,5 WG (inkább később, a gyümölcsmoníliára ajánlják.), a Signum WG, stb.

Kajsziban és őszibarackban: Topas 100 EC, Signum WG, Switch 62,5 WG, Teldor 500 SC, stb. (Csak őszibarackban, nektarinban engedélyezett a Prolectus.)

Jó minőségben, apró cseppképzéssel történjen a kezelés. Teljesen be kell fednünk a virágokat, a bibéket! Permetezereink tapadását, esőállóságát a cseppek szétterülését növelhetjük pl. Silwet L, Silwet Star, Nonit, Biosol- Káliszappan, Wetcit, Melius hozzáadásával.

Több biostimuláló készítménynél leírták a monília elleni mellékhatást (2. felhívás). A növény ellenálló képességét a növelik és ezzel mindenképpen segítenek minket a monília elleni küzdelemben.

Amennyiben mégis megtörtént a fertőzés, azt már a szíromleveleken, a bibén vagy a porzókon is láthatjuk, apró, barna foltok alakjában. A szíromlevelek petyhüdtek. A kajszivirágok tövénél apró mézgacseppek is megjelenhetnek. Később az egész virág elbarnul, nagy részük elszáradva a fán marad. Ez a meggyenél különösen feltűnő. Ekkor már a vessző belsejében terjed a kórokozó. Nagy sebességgel halad a vágatok, majd a törzs felé. Itt már csak a gyors metszés segít! A fertőzött rész alatt 20-30 cm-rel kell levágni a száradás tüneteit mutató vesszőt, ágat.

A cseresznye, az őszibarack, a mandula, egyes szilva fajták és számos dísznövény pl. japánbirs, aranyfa (*Forsythia*), törpemandula, díszősziarack, díszcseresznye, babarózsa is károsodhat a virágfertőző moníliától.

További növényvédelmi előrejelzésekért, fotókéért és a teljes hazai növényvédő szer adatbázishoz látogassa meg az Agroinform.hu/novenyvedelem mezőgazdasági portált.

Budapest, 2018. április 8.

Jó kertészkedést kívánok:

Zsigó György, NMNK

A Hermes ÁFÉSZ üzleteiben a megemlített növényvédő szereket is megvásárolhatják és növényvédelmi szaktanácsot is kaphatnak!