

VÁRHATÓ NÖVÉNYVÉDELMI TENDENCIÁK 2019.-RA

- ▣ A növényvédelmi helyzetet befolyásoló tényezők:
- ▣ 2017 őszi időjárás, hatásai.
- ▣ 2016.-os 2017.-es téli időjárás
- ▣ Áttelelő károsítók és várható veszélyek.
- ▣ 2017.-os év új kihívásai, új veszélyek.

- ▣ Szántóföldön már a múlt évben megjelent a búza lisztharmat, de ennél erőteljesebben a búza sárgarozsda.
- ▣ A tél függvénye a hópenész és a felfagyás.

- ❑ Szőlőkben: nincs nagy mennyiségű áttelelő képlet sem lisztharmatból, sem peronoszpórából, szürkepenészből.
- ❑ A szőlő fitoplazma betegsége oda kell figyelni, ha a betegség átvitelét okozó amerikai szőlőkabóca megjelenik, ne késlekedjünk, mentsük meg az ültetvényeket.
- ❑ Szőlő lisztharmat a korai lemosó most nem szükséges, de 2-5 leveles állapotban kénnel és felszívódó szőlő lisztharmat elleni szerrel az első védekezést tegyük meg.

- ▣ Almában a bimbólikasztó újra megjelent.
- ▣ Levéltetvekből sok az áttelelő tojás. Alma levélpirosító tetű kártétel ellen a korai védekezés.
- ▣ Atka nincs nagy áttelelő egyedszám.
- ▣ Alma baktériumos elhalás (Erwinia) mindig veszélyeztethet.

- ▣ Csonthéjasok: Itt van a legtöbb gond!!
- ▣ Az Erwinia is kórokozó lett.
- ▣ Egy új kórokozó a Phytoplasma prunorum a teljes csonthéjas kört megbetegítheti. Tünetei a gutaütéshez hasonlóak.
- ▣ A szilva-levélbolha a betegség átvitelében a felelős.
- ▣ A kifakadás kezdetén végzett kezelés elengedhetetlen. Réz és Aliette kísérletképpen

- ▣ Levéltetvek itt is nagy egyedszámban jöhetnek. Cseresznye, őszibarack, szilva, de bogyósokban is ribiszke, köszméte.
- ▣ Az amerikai bivalykabóca már a gyümölcsösökben, de szőlőben is volt múlt évben. Dísznövényeken jelenik meg először és akkor védekezzünk ellene. Piretroid olajjal és nedvesítővel.